

Meldung einer Lyme-Borreliose gemäß § 2 der Landesverordnung über die Erweiterung der Meldepflicht für übertragbare Krankheiten des Landes Rheinland-Pfalz

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| <p>Gesundheitsamt Mayen-Koblenz Sachgebiet Infektionsschutz / Umweltmedizin Bannerberg 6 56727 Mayen Mail: ifsg@kvmyk.de Tel.: 02651-9643180</p> | <p>Wohnort des Falles (erste 3 PLZ-Ziffern): ___ __ __</p> <p>Geburtsjahr: _____ Geschlecht: <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w</p> <p>Zeckenbiss: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> unbekannt/nicht erinnerlich</p> <p>falls ja: Ort/Region: _____ <input type="checkbox"/> Ort unbekannt</p> <p>Monat, Jahr: _____._____ <input type="checkbox"/> Zeit unbekannt</p> <p>Auftreten erster Symptome (Tag, Monat, Jahr): _____._____._____ <input type="checkbox"/> unbekannt/nicht erinnerlich</p> <p>Datum der Diagnose (Tag, Monat, Jahr): _____._____._____ Stationäre Behandlung: <input type="checkbox"/> ja von:_____._____._____ bis:_____._____._____ <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unbekannt</p> <p><input type="checkbox"/> Tod durch Borreliose</p> | | | | | | | | |
| <p>Absendender Arzt: (Anschrift/Stempel mit Telefonnummer)</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:35%; padding: 5px;">Klinik</td> <td style="padding: 5px;">Labordiagnostischer Nachweis</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> Erythema migrans, definiert als sich vergrößernder, rötlicher oder bläulich-roter, rundlicher Fleck oder mehrere Flecken, oft mit zentraler Abblassung </td> <td style="padding: 5px;"> entfällt, da klinische Diagnose. Laborbefunde können ergänzend unten angekreuzt werden. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Lyme-Arthritis, definiert als Vorliegen beider folgender Kriterien: <input type="checkbox"/> akute Mono- oder Oligoarthritis mit Erguss <input type="checkbox"/> Ausschluss von Arthritiden anderer Genese (reaktive Arthritiden und Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises). </td> <td style="padding: 5px;"> Positiver Befund mindestens einer der drei folgenden Methoden Indirekter (serologischer) Nachweis <input type="checkbox"/> IgG-Antikörpernachweis (z.B. EIA, ELISA) <input type="checkbox"/> bestätigt z. B. mit Western-Blot oder Line-Assey Direkter Erregernachweis nur aus Gelenkpunktat <input type="checkbox"/> Erregerisolierung (kulturell) <input type="checkbox"/> Nukleinsäure-Nachweis (z.B. PCR) andere Nachweismethode: _____ </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Akute Neuroborreliose, definiert als mindestens eines der 3 folgenden Kriterien: <input type="checkbox"/> akute schmerzhafte Radikuloneuritis <input type="checkbox"/> Meningitis <input type="checkbox"/> akute Lähmung von Hirnnerven </td> <td style="padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> Nachweis einer lymphozytären Pleozytose UND positiver Befund mit mindestens einer der drei Methoden Indirekter (serologischer) Nachweis <input type="checkbox"/> erhöhter Liquor/Serum-Antikörper-Index zum Nachweis intrathekal gebildeter Antikörper Direkter Erregernachweis nur aus Liquor <input type="checkbox"/> Erregerisolierung (kulturell) <input type="checkbox"/> Nukleinsäure-Nachweis (z.B. PCR) <input type="checkbox"/> positiver Befund mit mindestens einer der vier folgenden Methoden Indirekter (serologischer) Nachweis <input type="checkbox"/> erhöhter Liquor/Serum-Antikörper-Index zum Nachweis intrathekal gebildeter Antikörper <input type="checkbox"/> IgG-Antikörpernachweis (z.B. EIA, ELISA) <input type="checkbox"/> bestätigt z. B. mit Western-Blot oder Line-Assey Direkter Erregernachweis nur aus Liquor <input type="checkbox"/> Erregerisolierung (kulturell) <input type="checkbox"/> Nukleinsäure-Nachweis (z.B. PCR) andere Nachweismethode: _____ </td> </tr> </table> | | Klinik | Labordiagnostischer Nachweis | <input type="checkbox"/> Erythema migrans , definiert als sich vergrößernder, rötlicher oder bläulich-roter, rundlicher Fleck oder mehrere Flecken, oft mit zentraler Abblassung | entfällt , da klinische Diagnose. Laborbefunde können ergänzend unten angekreuzt werden. | Lyme-Arthritis , definiert als Vorliegen beider folgender Kriterien: <input type="checkbox"/> akute Mono- oder Oligoarthritis mit Erguss <input type="checkbox"/> Ausschluss von Arthritiden anderer Genese (reaktive Arthritiden und Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises). | Positiver Befund mindestens einer der drei folgenden Methoden Indirekter (serologischer) Nachweis <input type="checkbox"/> IgG -Antikörpernachweis (z.B. EIA, ELISA) <input type="checkbox"/> bestätigt z. B. mit Western-Blot oder Line-Assey Direkter Erregernachweis nur aus Gelenkpunktat <input type="checkbox"/> Erregerisolierung (kulturell) <input type="checkbox"/> Nukleinsäure-Nachweis (z.B. PCR) andere Nachweismethode: _____ | Akute Neuroborreliose , definiert als mindestens eines der 3 folgenden Kriterien: <input type="checkbox"/> akute schmerzhafte Radikuloneuritis <input type="checkbox"/> Meningitis <input type="checkbox"/> akute Lähmung von Hirnnerven | <input type="checkbox"/> Nachweis einer lymphozytären Pleozytose UND positiver Befund mit mindestens einer der drei Methoden Indirekter (serologischer) Nachweis <input type="checkbox"/> erhöhter Liquor/Serum-Antikörper-Index zum Nachweis intrathekal gebildeter Antikörper Direkter Erregernachweis nur aus Liquor <input type="checkbox"/> Erregerisolierung (kulturell) <input type="checkbox"/> Nukleinsäure-Nachweis (z.B. PCR) <input type="checkbox"/> positiver Befund mit mindestens einer der vier folgenden Methoden Indirekter (serologischer) Nachweis <input type="checkbox"/> erhöhter Liquor/Serum-Antikörper-Index zum Nachweis intrathekal gebildeter Antikörper <input type="checkbox"/> IgG -Antikörpernachweis (z.B. EIA, ELISA) <input type="checkbox"/> bestätigt z. B. mit Western-Blot oder Line-Assey Direkter Erregernachweis nur aus Liquor <input type="checkbox"/> Erregerisolierung (kulturell) <input type="checkbox"/> Nukleinsäure-Nachweis (z.B. PCR) andere Nachweismethode: _____ |
| Klinik | Labordiagnostischer Nachweis | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Erythema migrans , definiert als sich vergrößernder, rötlicher oder bläulich-roter, rundlicher Fleck oder mehrere Flecken, oft mit zentraler Abblassung | entfällt , da klinische Diagnose. Laborbefunde können ergänzend unten angekreuzt werden. | | | | | | | | |
| Lyme-Arthritis , definiert als Vorliegen beider folgender Kriterien: <input type="checkbox"/> akute Mono- oder Oligoarthritis mit Erguss <input type="checkbox"/> Ausschluss von Arthritiden anderer Genese (reaktive Arthritiden und Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises). | Positiver Befund mindestens einer der drei folgenden Methoden Indirekter (serologischer) Nachweis <input type="checkbox"/> IgG -Antikörpernachweis (z.B. EIA, ELISA) <input type="checkbox"/> bestätigt z. B. mit Western-Blot oder Line-Assey Direkter Erregernachweis nur aus Gelenkpunktat <input type="checkbox"/> Erregerisolierung (kulturell) <input type="checkbox"/> Nukleinsäure-Nachweis (z.B. PCR) andere Nachweismethode: _____ | | | | | | | | |
| Akute Neuroborreliose , definiert als mindestens eines der 3 folgenden Kriterien: <input type="checkbox"/> akute schmerzhafte Radikuloneuritis <input type="checkbox"/> Meningitis <input type="checkbox"/> akute Lähmung von Hirnnerven | <input type="checkbox"/> Nachweis einer lymphozytären Pleozytose UND positiver Befund mit mindestens einer der drei Methoden Indirekter (serologischer) Nachweis <input type="checkbox"/> erhöhter Liquor/Serum-Antikörper-Index zum Nachweis intrathekal gebildeter Antikörper Direkter Erregernachweis nur aus Liquor <input type="checkbox"/> Erregerisolierung (kulturell) <input type="checkbox"/> Nukleinsäure-Nachweis (z.B. PCR) <input type="checkbox"/> positiver Befund mit mindestens einer der vier folgenden Methoden Indirekter (serologischer) Nachweis <input type="checkbox"/> erhöhter Liquor/Serum-Antikörper-Index zum Nachweis intrathekal gebildeter Antikörper <input type="checkbox"/> IgG -Antikörpernachweis (z.B. EIA, ELISA) <input type="checkbox"/> bestätigt z. B. mit Western-Blot oder Line-Assey Direkter Erregernachweis nur aus Liquor <input type="checkbox"/> Erregerisolierung (kulturell) <input type="checkbox"/> Nukleinsäure-Nachweis (z.B. PCR) andere Nachweismethode: _____ | | | | | | | | |